

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerű alkalmazása.

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

Herbária

Mecsek Gyomor teakeverék

Gyógyszerek nem minősülő gyógyhatású készítmény,
melynek hatását irodalmi adatok bizonyítják.

Mi a hatóanyaga?

1 csapott evőkanálnyi (kb. 2 g) készítmény tartalma: 0,80 g Körömvirág (*Calendulae flos*), 0,40 g Kamillavirágzat (*Matricariae flos*), 0,20 g Közönséges cickafark virágos hajtás (*Millefolii herba*), 0,20 g Csipkerózsa áltermés (*Rosae pseudo-fructus*), 0,20 g Keserű édeskömény termés (*Foeniculi amari fructus*), 0,20 g Közönséges orbáncfű virágos hajtás (*Hyperici herba*).

Mit tartalmaz még a készítmény?

A teakeverék a gyógynövényeken kívül mást nem tartalmaz.

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?

Gyomorbántalmak esetén, gyomor- és nyombélfekély megelőzésére, a gyógyszeres kezelés kiegészítésére alkalmazható gyulladáscsökkentő teakeverék.

Mikor nem ajánlott a készítmény alkalmazása?

Ne alkalmazza a készítményt, ha az alkotórészekkel – főleg fészkesvirágzatúak – szembeni egyéni túlérzékenysége van.

Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?

Fényérzékenység esetén, a teakeverék alkalmazása alatt tartózkodni kell az erős fényhatásoktól (napozás, szolárium).

Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek?

A teakeverék alkalmazása gyermekeknek nem ajánlott.

Alkalmazható-e a teakeverék más gyógyszerekkel?

A teakeverék alkalmazása – orbáncfű tartalma miatt – egyidejűleg nem ajánlott a következő gyógyszerekkel, mert azok hatását módosíthatja: INDINAVIR, HIV- és epilepszia ellenes szerek, kumarin típusú antikoagulánsok (pl.: Syncumar), szájon át szedhető fogamzásgátlók, Digoxin, cyclosporin (pl.: Sandimmun) és theophyllin tartalmú készítmények.

Fogyasztható-e a tea várandósság és szoptatás ideje alatt?

A teakeverék hatóanyagai átjuthatnak a magzatba, ill. az anyatejjel kiválasztódva a csecsemőbe, ezért ezen élethelyzetekben nem javasolt a tea fogyasztása.

Hogyan és milyen adagolásban kell a teát fogyasztani?

Egy csészényi (kb. 2,5 dl) forró vízzel 1 csapott evőkanálnyi (kb. 2 g) teakeveréket leforrázunk, majd lefedve 10-20 percig állni hagyjuk. Leszűrve mézzel édesítve, langyosan, kortyonként fogyasztható étkezés közben vagy után, naponta 2-3 csészényit.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?

Ritkán, világos bőrű egyéneknél erős fényhatásokra (napozás, szolárium) allergiás bőrreakció (bőrpír, viszketés, bőrkiütés) jelentkezhet.

Mire kell még ügyelnie a készítmény alkalmazása során?

A teakeveréket gyermekek elől el kell zárni!

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?

1-2 hónapig kúraszerűen lehet fogyasztani. Azonban ha tünetei nem javulnak, ill. rosszabbodnak, hagyja abba a tea fogyasztását.

Hogyan kell tárolni a készítményt?

Legfeljebb 25 °C-on, nedvességtől védve.

Csomagolási egység: 50 g

Nyilvántartási szám: OGYI-003/1986.

Gyártja/Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Herbária Zrt.

1134 Budapest, Dózsa György út 144.