

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerű alkalmazása.

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

Herbária

Meghülés tüneteit enyhítő teakeverék

Tulajdonság / hatás:

Gyógyszerem nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását népgyógyászati adatok igazolják. A készítmény hatóanyagai feloldják a légutakban lerakódott nyákot, enyhítik a köhögési ingert, különösen görcsös köhögés esetén köptető és fertőtlenítő hatásúak.

Mi a hatóanyaga?

1 tetézett evőkanányi (kb. 7 g) teakeverék tartalma: 1,75 g Orvosi ziliz gyökér (Althaeae radix), 1,40 g Kerti és spanyol kakukkfű levél és virág (Thymi herba), 1,05 g Hársfavirágzat (Tiliae flos), 0,70 g Fekete bodza virág (Sambuci flos), 0,70 g Igazi édesgyökér (Liquiritiae radix), 0,70 g Keserű édeskömény termés (Foeniculi amari fructus), 0,70 g Orvosi ziliz levél (Althaeae folium).

Mit tartalmaz még a készítmény?

A teakeverék nem tartalmaz ízesítő és színezőanyagokat.

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?

Ha meghűléses megbetegedése köhögéssel, váladékképződéssel jár, a teakeverék segíti a légúti váladék eltávolítását, enyhíti köhögését. Akut és krónikus hörghurut (pl. dohányosok) esetén is alkalmazható.

Mikor nem ajánlott a készítmény alkalmazása?

Ne alkalmazza a teát, ha bármely alkotórészével szemben ismert túlérzékenysége van.

Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése előtt?

Tudnia kell, hogy kezelendő problémái milyen eredetűek. Amennyiben bizonytalan a tünetek okában, forduljon orvosához.

Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek?

Összetétele és alkalmazási javaslata alapján a készítmény 6 éves kortól gyermekeknek is ajánlott.

Alkalmazható-e a teakeverék más gyógyszerekkel?

A teakeverék és más gyógyszer vagy gyógyhatású termék bevétele közötti idő 1-2 óra legyen.
Izzadást előidéző gyógyszerek (pl. acetil-szalicilsav származékok) hatását fokozhatja.

Mit kell megfontolni várandósság és szoptatás ideje alatt?

A készítmény alkalmazása várandósság ideje alatt nem ajánlott, szoptatás ideje alatt kellő óvatossággal alkalmazható.

Hogyan és milyen adagolásban kell a teát fogyasztani?

Felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek: 1 tetézt evőkanálnyi (kb. 7 g) teakeveréket 1 csésze (kb. 2,5 dl) forró vízzel leönteni, időnként kevergetve fél óráig hűlni hagyni, majd szűrni. Tetszés szerint ízesítve naponta 3-4 alkalommal 1-1 csészével, kúraszerűen fogyasztható.

6-12 éves kor közötti gyermekeknek: 1 csapott evőkanálnyi teakeveréket 1 csésze (kb. 2,5 dl) forró vízzel leönteni és a fentiek szerint elkészítve naponta 2 alkalommal, reggel és este ajánlott fogyasztani.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?

Az adagolási javaslat betartása esetén, esetleges egyéni túlérzékenységen kívül, nem kívánt hatása nem ismeretes. Ha nem várt hatást észlel, hagyja abba a tea alkalmazását.

Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazása során?

Izzasztó hatása miatt szívbetegnek a tea fogyasztása csak részletekben javasolt. Szívbeteg, főleg szívglikozidot és/vagy vizelethajtót (amelyek a szérum kálium szintet csökkenthetik) szedők a készítményt kellő óvatossággal fogyasszák.

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?

A tea fogyasztása a meghűléses panaszok enyhüléséig ill. megszűnéséig javasolt, azonban ha 5-7 nap alkalmazás után sem javul az állapota, forduljon szakemberhez (orvos, gyógyszerész).

Hogyan kell tárolni a készítményt?

Legfeljebb 25 °C-on, nedvességtől védve.

A készítmény gyermekek elől elzárva tartandó!

Csomagolási egység: 100 g

Nyilvántartási szám: OGYI-081/1988

Gyártja/Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Herbária Zrt.

1134 Budapest,
Dózsa György út 144.